318.00

109.00

ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΕΡΓΙΑ
45 LET VÝZKUMU ALERGIE
ROKOV VÝSKUMU ALERGIE

NUTRICIA

Neocate® JUNIOR

Υποαλλεργικό
Βρεφική φόρμουλα με βάση τα αμινοξέα

Hypoalergenní
Výživa na bázi aminokyselin, v prášku

Hypoalergénna
Výživa na báze aminokyselín, v prášku

1+ ετών rok

Ουδέτερη Γεύση • bez příchutě • bez príchute

ΤΡΟΦΙΜΟ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΛΗΡΕΣ | POTRAVINA PRO ZVLÁŠTNÍ LÉKAŘSKÉ ÚČELY NUTRIČNĚ KOMPLETNÍ | POTRAVINA NA OSOBITNÉ LEKÁRSKE ÚČELY NUTRIČNE KOMPLETNÁ

400 g ℮

GR **Τρόφιμο για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς. Για τη διαιητητική διαχείριση της αλλεργίας στο γάλα αγελάδας, πολυτροφικών αλλεργιών και άλλων ενδείξεων όπου συνιστάται φόρμουλα με βάση τα αμινοξέα.**

Σημαντική σημείωση: Για εντερική χρήση μόνο. Δεν προορίζεται για παρεντερική χρήση. Πρέπει να χορηγείται υπό ιατρική επίβλεψη. Ακατάλληλο για βρέφη ηλικίας κάτω του 1 έτους. Κατάλληλο ως αποκλειστική πηγή διατροφής ή συμπληρωματικά στη διατροφή του ασθενούς.

Συστατικά: αποξηραμένο σιρόπι γλυκόζης, εξευγενισμένα φυτικά έλαια (τριγλυκερίδια μέσης αλύσσου (φοινικοπυρηνέλαιο και/ή έλαιο καρύδας), ηλιέλαιο υψηλής περιεκτικότητας σε ελαϊκό οξύ, κραμβέλαιο, ηλιέλαιο), L-σερίνη, L-γλουταμίνη, μαλτοδεξτρίνη, γλυκίνη, L-αλανίνη, L-λευκίνη, οξική L-λυσίνη, L-θρεονίνη, κιτρικό κάλιο, L-τυροσίνη, γαλακτωματοποιητής (E472(γ)), L-βαλίνη, L-ισολευκίνη, διβασικό φωσφορικό ασβέστιο, χλωριούχο μαγνήσιο, L-προλίνη, όξινο φωσφορικό νάτριο, ανθρακικό ασβέστιο, L-κυστίνη, L-ιστιδίνη, L-φαινυλαλανίνη, όξινο φωσφορικό κάλιο, L-μεθειονίνη, L-αργινίνη, χλωριούχο νάτριο, διτριγυκή χολίνη, L-τρυπτοφάνη, κιτρικό ασβέστιο, L-ασκορβικό οξύ, χλωριούχο ασβέστιο, αντοξειδωτικά (λεκιθίνη ηλιάνθου, πολύμικτος ασκορβυλεστέρας), ταυρίνη, M-ινοσιτόλη, θειικός σίδηρος, L- καρνιτίνη, θειικός ψευδάργυρος, οξική DL-α-τοκοφερόλη, νικοτιναμίδιο, D-παντοθενικό ασβέστιο, θειικός χαλκός, ριβοφλαβίνη, θειικό μαγγάνιο, υδροχλωρική θειαμίνη, υδροχλωρική πυριδοξίνη, οξική βιταμίνη Α, ιωδιούχο κάλιο, φυλλικό οξύ, μολυβδαινικό νάτριο, χλωριούχο χρώμιο, σελληνώδες νάτριο, φυτομεναδιόνη, D-βιοτίνη, χολεκαλσιφερόλη, κυανοκοβαλαμίνη.

Παράγεται από: SHS International Ltd., 100 Wavertree Boulevard, Liverpool L7 9PT, Ηνωμένο Βασίλειο

Αρ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 43572/25-05-2016 (Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης)

Υπεύθυνος Κυκλοφορίας: Numil Hellas A.E. Παράδρομος 17ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας & Καλαμάτας 2- 14564 Ν. Κηφισιά-Τηλ 2108248547-Γραμμή Επικοινωνίας 8001168600 χωρίς χρέωση
www.nutricia-medical.gr

Αποθήκευση: Να φυλάσσεται σε δροσερό και ξηρό μέρος. Για πρόσθετες πληροφορίες πριν από τη χρήση, παρακαλούμε δείτε το συνημμένο φυλλάδιο. Συσκευασμένο σε προστατευτική ατμόσφαιρα.

Ανάλωση έως: Βλέπετε το κάτω μέρος της συσκευασίας

CZ **Potravina pro zvláštní lékařské účely.** Pro řízenou dietní výživu při alergii na bílkovinu kravského mléka, mnohočetných potravinových alergiích a jiných indikacích vyžadujících výživu na bázi aminokyselin.

Důležitá upozornění: Pouze pro enterální použití. Není určeno pro parenterální podávání. Pouze pro použití pod lékařským dohledem. Nevhodné pro kojence do 1 roku. Vhodné jako jediný zdroj výživy nebo k doplnění stravy pacienta.

Složení: sušený glukózový sirup, rafinované rostlinné oleje (triglyceridy se středně dlouhým řetězcem (palmojádrový a/nebo kokosový olej), slunečnicový s vysokým obsahem kyseliny olejové, řepkový, slunečnicový), L-serin, L-glutamin, maltodextrin, glycin, L-alanin, L-leucin, L-lysin-acetát, L-threonin, citronan draselný, L-tyrosin, emulgátor (E472c), L-valin, L-isoleucin, hydrogenfosforečnan vápenatý, chlorid hořečnatý, L-prolin, hydrogenfosforečnan disodný, uhličitan vápenatý, L-cystin, L-histidin, L-fenylalanin, hydrogenfosforečnan draselný, L-methionin, L-arginin, chlorid sodný, cholin bitartrát, L-tryptofan, citronan vápenatý, kyselina L-askorbová, chlorid vápenatý, antioxidanty (slunečnicový lecitin, askorbyl-palmitát), taurin, M-inositol, síran železnatý, L-karnitin, síran zinečnatý, DL-α-tokoferyl-acetát, nikotinamid, D-pantothenát vápenatý, síran měďnatý, riboflavin, síran manganatý, thiaminhydrochlorid, pyridoxin hydrochlorid, retinyl-acetát, jodid draselný, kyselina pteroylmonoglutamová, molybdenan sodný, chlorid chromitý, seleničitan sodný, fytomenadion, D-biotin, cholekalciferol, kyanokobalamin.

Výrobce: SHS International Ltd., 100 Wavertree Boulevard, Liverpool L7 9PT, Velká Británie

Kontakt pro ČR: Danone a.s., V parku 2294/2, 148 00 Praha 4 - Chodov, infolinka: 800 110 001, www.nutricia.cz

Skadování: Skladujte na chladném a suchém místě. Před použitím si pročtěte další informace uvedené v přiloženém letáku. Baleno v ochranné atmosféře.

Minimální trvanlivost do: viz dno plechovky

SK **Potravina na osobitné lekárske účely.** Na diétny režim pri alergii na bielkovinu kravského mlieka, viacnásobnej potravinovej alergii a iných indikáciách vyžadujúcich výživu na báze aminokyselín.

Dôležité upozornenia: Len na enterálne použitie. Nie je určené na parenterálne použitie. Používajte len pod lekárskym dohľadom. Nevhodné pre dojčatá do 1 roku veku. Vhodné ako jediný zdroj výživy alebo na doplnenie stravy pacienta.

Zloženie: sušený glukózový sirup, rafinované rastlinné oleje (triglyceridy so stredne dlhým reťazcom (palmojadrový a/alebo kokosový olej), slnečnicový s vysokým obsahom kyseliny olejovej, repkový, slnečnicový), L-serín, L-glutamín, maltodextrín, glycín, L-alanín, L-leucín, L-lyzinoctan, L-treonín, citran draselný, L-tyrozín, emulgátor (E472c), L-valín, L-izoleucín, hydrogénfosforečnan vápenatý, chlorid horečnatý, L-prolín, hydrogénfosforečnan disodný, uhličitan vápenatý, L-cystín, L-histidín, L-fenylalanín, hydrogénfosforečnan didraselný, L-metionín, L-arginín, chlorid sodný, cholín dvojvínan, L-tryptofán, citran vápenatý, kyselina L-askorbová, chlorid vápenatý, antioxidanty (slnečnicový lecitín, askorbylpalmitát), taurín, M-inozitol, síran železnatý, L-karnitín, síran zinočnatý, DL-alfa-tokoferylacetát, nikotínamid, D-pantotenát vápenatý, síran meďnatý, riboflavín, síran mangánatý, tiamínhydrochlorid, pyridoxínhydrochlorid, retinylacetát, jodid draselný, kyselina pteroylmonoglutámová, molybdénan sodný, chlorid chromitý, seleničitan sodný, fytomenadión, D-biotín, cholekalciferol, kyanokobalamín.

Výrobca: SHS International Ltd., 100 Wavertree Boulevard, Liverpool L7 9PT, Velká Británia

Kontakt pre SR: Danone s.r.o., Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov. Infolinka: 0800 444 006, www.neocate.sk

Skladovanie: Skladujte na suchom a chladnom mieste. Pred použitím si prečítajte ďalšie informácie uvedené v priloženom letáku. Balené v ochrannej atmosfére.

Minimálna trvanlivosť do: pozrite dno plechovky

TEXT (Mount)

2D

MAT. NUMBER

EAN 100% (Min 85%)

9.00 12.70 17.30 30.00 9.00 39.62 12.70

1

318.00

109.00 99.00

GR **Προτεινόμενη πρόσληψη:**
Η ποσότητα της τροφής και της αραίωσης θα πρέπει να καθορίζεται μόνο από ιατρό ή διαιτολόγο, και εξαρτάται από την ηλικία, το σωματικό βάρος και την ιατρική κατάσταση του ασθενούς.
Συνιστώμενη συγκέντρωση τροφής:
Η συνιστώμενη συγκέντρωση τροφής είναι 21,1% βάρος κατ' όγκο (1kcal/ml) - για την επίτευξη αυτής της συγκέντρωσης προσθέστε μία μεζούρα προϊόντος σε 30ml νερό. Μία μεζούρα παρέχει 7,3g σκόνης.
Προετοιμασία:
• Πλύνετε τα χέρια σας και καθαρίστε όλα τα σκεύη.
• Προσθέστε την συνιστώμενη ποσότητα νερού σε ένα δοχείο.
• Προσθέστε την απαραίτητη ποσότητα σκόνης στο νερό. Χρησιμοποιήστε μόνο την παρεχόμενη μεζούρα.
• Καλύψτε το δοχείο και ανακινήστε το προϊόν μέχρι να διαλυθεί η σκόνη. Μετά την ανακύνθεση, φυλάσσεται στο ψυγείο και μπορεί να καταναλωθεί εντός 24 ωρών. Ανακινήστε ή αναδεύστε άμεσα πριν από την κατανάλωση. Εάν χορηγείται από το στόμα, καταναλώνεται καλύτερα δροσερό.
Σημείωση: Μην βράζετε την παρασκευασμένη τροφή. Μην χρησιμοποιείτε τον φούρνο μικροκυμάτων για την παρασκευή ή το ζέσταμα της τροφής.
Αποθήκευση: Να φυλάσσεται σε δροσερό και ξηρό μέρος. Πάντα να επανατοποθετείτε το καπάκι στο κουτί μετά από τη χρήση. Μετά το άνοιγμα μπορεί να καταναλωθεί εντός ενός (1) μήνα.
Συσκευασμένο σε προστατευτική ατμόσφαιρα.

CZ **Doporučený příjem:**
Množství a ředění výživy určí lékař nebo pracovník kvalifikovaný v oblasti klinické výživy v závislosti na věku, tělesné hmotnosti a zdravotním stavu pacienta.
Doporučená koncentrace výživy:
Doporučená koncentrace výživy je 21,1 % (1 kcal/ml) - k dosažení této koncentrace přidejte 1 zarovnanou odměrku na každých 30 ml vody. 1 zarovnaná odměrka obsahuje 7,3 g prášku.
Příprava:
• Umyjte si důkladně ruce a používejte čisté nádobí.
• Doporučené množství vody odměřte do nádoby.
• Do vody přidejte předepsané množství prášku. Používejte pouze přiloženou odměrku.
• Nádobu uzavřete a obsah důkladně protřepejte, dokud se prášek zcela nerozpustí.
Připravenou výživu uchovávejte v chladničce a spotřebujte do 24 hodin od přípravy. Bezprostředně před použitím výživu protřepejte nebo zamíchejte. Pro perorální podání - výrobek nejlépe o[illegible]utná v ohlazeny.
Upozornění: Připravenou v[illegible]živu n[illegible]ev[illegible]ařujte [illegible] přípravě[illegible] ohřívání výživy nepoužívejte mikrovlnnou [illegible]oubu.
Skadování: Skladujte na chladném a suchém místě. Po každém použití plechovku dobře uzavřete. Obsah plechovky spotřebujte do 1 měsíce po otevření.
Baleno v ochranné atmosféře.

SK **Odporúčaný príjem:**
Množstvo a koncentráciu výživy určí lekár alebo pracovník kvalifikovaný v oblasti klinickej výživy v závislosti od veku, telesnej hmotnosti a zdravotného stavu pacienta.
Odporúčaná koncentrácia výživy:
Odporúčaná koncentrácia výživy je 21,1 % (1 kcal/ml) - na dosiahnutie tejto koncentrácie pridajte 1 zarovnanú odmerku prášku na každých 30 ml vody. 1 zarovnaná odmerka obsahuje 7,3 g prášku.
Príprava:
• Umyte si dôkladne ruky a používajte čistý riad.
• Odmerajte odporúčané množstvo vody do nádoby.
• Do vody pridajte predpísané množstvo prášku. Používajte iba priloženú odmerku.
• Nádobu uzatvorte a obsah dôkladne pretrepte, kým sa prášok úplne nerozpustí.
Pripravenú výživu uchovávajte v chladničke a spotrebujte do 24 hodín od prípravy. Tesne pred použitím výživu pretrepte alebo premiešajte. Pre perorálne podanie - výrobok najlepšie chutí vychladený.
Upozornenie: Pripravenú výživu neprevárajte. Nepoužívajte mikrovlnnú rúru na prípravu ani na zohrievanie výživy.
Skladovanie: Skladujte na suchom a chladnom mieste. Po každom použití plechovku dobre uzatvorte. Obsah plechovky spotrebujte do 1 mesiaca po otvorení.
Balené v ochrannej atmosfére.

TEXT (Base)

	Μεζούρες/Odměrky/Odmerky	Νερό (ml)/Voda (ml)	Κατά προσέγγιση συνολικός όγκος (ml)/Přibližný celkový objem (ml)/Približný celkový objem (ml)
	1 (7.3 g)	30	35
	3 (21.9 g)	90	105
	10 (73 g)	300	350

MAT. NUMBER

318.00

109.00

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑ / NUTRIČNÍ INFORMACE NA / VÝŽIVOVÉ ÚDAJE NA	100 gr ΣΚΟΝΗΣ: / 100 g PRÁŠKU:	100 ml*
Ενέργεια/ Energetická hodnota/ Energia	1992 kJ	420 kJ
	475 kcal	100 kcal
Λιπαρά/ Tuky (42 Er%)	22.0 g	4.6 g
εκ των οποίων/ z toho		
- Κορεσμένα/ Nasycené mastné kyseliny/ Nasýtené mastné kyseliny	9.4 g	2.0 g
- Μονοακόρεστα/ Mononenasycené mastné kyseliny/ Mononenasýtené mastné kyseliny	7.7 g	1.6 g
- Πολυακόρεστα/ Polynenasycené mastné kyseliny/ Polynenasýtené mastné kyseliny	4.0 g	0.84 g
Υδατάνθρακες/ Sacharidy (47 Er%)	56.0 g	11.8 g
εκ των οποίων/ z toho		
- Σάκχαρα/ Cukry	5.0 g	1.1 g
Εδώδιμες Ίνες/ Vláknina (0 Er%)	0 g	[illegible] g
Ισοδύναμο πρωτεΐνης/ Bílkoviny (ekvivalent)/ Bielkoviny (ekvivalent) (11 Er%)	13.3 g	2.[illegible] g
Αλάτι/ Sůl/ Soľ	0.71 g	0.15 g
Βιταμίνες/ Vitaminy/ Vitamíny		
Βιτ. A/ Vit. A	214 μg	45.2 μg
Βιτ. D/ Vit. D	6.2 μg	1.3 μg
Βιτ. E/ Vit. E	6.7 mg (α-TE/ET)	1.4 mg (α-TE/ET)
Βιτ. K/ Vit. K	19.0 μg	4.0 μg
Θειαμίνη/ Thiamin/ Tiamín	0.48 mg	0.10 mg
Ριβοφλαβίνη/ Riboflavin/ Riboflavín	0.95 mg	0.20 mg
Νιακίνη/ Niacin/ Niacín	(9.0 mg NE/EN) 5.3 mg	(1.9 mg NE/EN) 1.1 mg
Παντοθενικό Οξύ/ Kyselina pantothenová/ Kyselina pantoténová	1.9 mg	0.40 mg
Βιτ. B6/ Vit. B6	0.48 mg	0.10 mg

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑ / NUTRIČNÍ INFORMACE NA / VÝŽIVOVÉ ÚDAJE NA	100 gr ΣΚΟΝΗΣ: / 100 g PRÁŠKU:	100 ml*
Φυλλικό οξύ/ Kyselina listová	71.3 μg	15.0 μg
Βιτ. B12/ Vit. B12	1.2 μg	0.25 μg
Βιοτίνη/ Biotin/ Biotín	14.3 μg	3.0 μg
Βιτ. C/ Vit. C	47.5 mg	10.0 mg
Μέταλλα και ιχνοστοιχεία/ Minerální látky a stopové prvky/ Minerálne látky a stopové prvky		
Na	285 mg	60.1 mg
K	548 mg	115 mg
Cl	437 mg	92.2 mg
Ca	428 mg	90.3 mg
P	309 mg	65.2 mg
Mg	66.5 mg	14.0 mg
Fe	5.7 mg	1.2 mg
Zn	5.2 mg	1.1 mg
Cu	0.48 mg	0.10 mg
Mn	0.29 mg	0.06 mg
Mo	21.4 μg	4.5 μg
Se	15.2 μg	3.2 μg
Cr	7.6 μg	1.6 μg
I	71.3 μg	15.0 μg
Λοιπά/ Jiné/ Iné		
Χολίνη/ Cholin/ Cholín	95.0 mg	20.0 mg
Ινοσιτόλη/ Inositol/ Inozitol	26.1 mg	5.5 mg
L-Καρνιτίνη/ L-karnitin/ L-karnitín	15.80 mg	3.3 mg
Ταυρίνη/ Taurin/ Taurín	31.45 mg	6.6 mg
Ωσμωτικότητα/ Osmolalita		600 mOsmol/kg H_2O

*Στην προτεινόμενη αραίωση 21.1%/ *Při doporučené koncentraci 21,1%/ *Pri odporúčanej koncentrácii 21,1%

DANONE

MAT. NUMBER

TEXT (Inner)

3.00

17.00

New Material No: 10487680	**CBU:** DANONE TRADING MEDICAL B.V.	Cyan DIG	Magenta DIG
Current Material No: 10476197	**Description:** Nutricia Neocate Unflavoured 400 g Can/Tin GR | CZ | SK	Yellow DIG	PMS 268 C DIG
Corporate Code: 629772		Matte Varnish -	
SAP Code: 129772			
Printer: Springfield Solutions			
Cutterguide: LVP129_Peel&Read_109x318mm.pdf			
2D: 10487680			
Consumer Unit: 5016533652673	**SGK No.: 403578801** **Date:** 31-01-2024	**r3**	
Supply Point: N/A			

REPRESENTATION: Colours represented with a diagonal line have been modified to aid PDF approval.

FINAL ART

SGK
Kingsway North - Team Valley
Newcastle - NE11 0JH - UK
T +44 (0) 191 491 7777
www.sgkinc.com
SGK is a Matthews International Corporation
Legend v2.0

LVP129_Peel&Read_109x318mm

Supply point: Liverpool
Amendment reason: Incorrect format of the cutterguide pages
PMA job number: SGS&CO – 7540025
N° Version: 2
Danone job number: CG01570_LVP129_Peel&Read_109x318mm
Date of creation: 18/12/2023
Scale: 1/1
Dimensions in mm

DANONE This drawing is issued on the understanding that it is copyright and to be regarded as confidential. It must not be used or reproduced without the prior written consent of the company.

Printing Specifications:
Packtype: Can/Tin
Material type: Can/Tin
Substrate: Paper
Printing Technique: Digital
Volume / Weight: 400 g
Format / Capacity: x1
Previous cutterguide or supplied drawing: LVP129_Peel&Read_109x318mm_existing.pdf

Additional Specifications

1 *Matt varnish can be applied on FOP*

Keylines | Corner / Crease | Bleed | TEXT Design and Text Area | No Design No Text Area Background Color and Varnish only | Codes and BBD Area (White Area) | No Printing Area